

Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση

1. Ποιό από τα παρακάτω δεν παρατηρείται στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση;

- α. Χρόνιος ξηρός βήχας
- β. Μείωση DLCO
- γ. Πληκτροδακτυλία
- δ. Παροξυσμική δύσπνοια

2. Όλες οι παρακάτω παθήσεις προσβάλλουν τα άνω πνευμονικά πεδία καθ' υπεροχήν, εκτός από την :

- α. Σαρκοείδωση
- β. Ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση
- γ. Ιστιοκύτωση Χ
- δ. Μεταπρωτοπαθή φυματίωση

3. Σε ποιό από τα παρακάτω νοσήματα η διαβρογχική βιοψία πνεύμονα έχει τη μικρότερη διαγνωστική αξία;

- α. IPF
- β. Σαρκοείδωση
- γ. Λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση
- δ. Ηωσινόφιλο κοκκίωμα

4. Ποιό από τα παρακάτω στοιχεία καθορίζει ουσιαστικά την πρόγνωση της IPF;

- α. Η νεαρή ηλικία
- β. Η απουσία πληκτροδακτυλίας
- γ. Η αρχική ανταπόκριση στη θεραπεία
- δ. Η διατήρηση φυσιολογικής διάχυσης για μεγάλο χρονικό διάστημα

5. Ποιό από τα παρακάτω σχετίζεται με καλή ανταπόκριση στη θεραπεία της IPF;

- α. Η μεγάλη ηλικία
- β. Η αύξηση των λεμφοκυττάρων στο BAL
- γ. Η προσβολή μόνο των κάτω πνευμονικών πεδίων
- δ. Η απουσία πληκτροδακτυλίας

6. Ποιά είναι τα συνηθέστερα ευρήματα κατά την πρώτη προσέλευση ασθενούς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF);

- α. Αιμόπτυση και πλειυριτική συλλογή
- β. Κυάνωση και πληκτροδακτυλία
- γ. Ξηρός βήχας και δύσπνοια
- δ. Παραγωγικός βήχας και αρθρίτιδα

7. Ποιό από τα παρακάτω φάρμακα ενοχοποιείται για πρόκληση πνευμονικής ίνωσης;

- α. Αμιωδαρόνη
- β. Ισονιαζίδη
- γ. Κοκαΐνη
- δ. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

8. Ποιό από τα παρακάτω νοσήματα εξελίσσεται συνηθέστερα σε πνευμονική ίνωση ;

- α. Σαρκοείδωση
- β. UIP
- γ. COP
- δ. Χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία

9. Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση εκτός από:

- α. Η νόσος προσβάλλει όλες τις ηλικίες (κυρίως 50-60 έτη)
- β. Η αναλογία ανδρών / γυναικών είναι 4/1
- γ. Υπάρχει οικογενής επίπτωση της νόσου
- δ. Η επίπτωση είναι περίπου 3/100.000

10. Η DIP αποτελεί φάσμα νοσημάτων με ένα από τα παρακάτω:

- α. IPF-UIP (ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση - συνήθη διάμεση πνευμονία)
- β. AIP-DAD (οξεία διάμεση πνευμονία - διάχυτη κυψελιδική βλάβη)
- γ. BOOP-COP (αναπνευστική βρογχιολίτιδα - οργανούμενη πνευμονία)
- δ. RB-ILD (Αναπνευστική Βρογχιολίτιδα με Συνοδό Διάμεση Πνευμονία)
- ε. LIP (λεμφοκυτταρική διάμεση πνευμονία)
- στ. NSIP (μη ειδική διάμεση πνευμονία)

11. Οργανούμενη πνευμονία (COP ή BOOP) μπορεί να επιπλέκει χορήγηση:

- α. Μπλεομυκίνης
- β. Ακτινοθεραπείας
- γ. Αμιοδαρόνης
- δ. Όλων των παραπάνω

12. Ποιό ποσοστό ασθενών με Λεμφοκυτταρική Διάμεση Πνευμονία (LIP) αναπτύσσει πνευμονική ίνωση ;

- α. 10%
- β. >20%
- γ. >30%
- δ. >50%

13. Ποιά είναι περίπου η θνητότητα της Οξείας Διάμεσης Πνευμονίας (AIP) τους πρώτους 1-2 μήνες από τη διάγνωσή της ;

- α. > 10%
- β. > 20%
- γ. > 50%
- δ. > 70%

14. Σε ποιά από τις παρακάτω ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες, δεν έχει διευκρινιστεί αν τα κορτικοστεροειδή τροποποιούν τη φυσική πορεία της νόσου;

- α. Κρυπτογενής Οργανούμενη Πνευμονία (COP)
- β. Λεμφοκυτταρική Διάμεση Πνευμονία (LIP)
- γ. Αποφολιδωτική Διάμεση Πνευμονία (DIP)
- δ. Αναπνευστική Βρογχιολίτιδα με Συνοδό Διάμεση Πνευμονία (RBILD)

15. Ποιά από τις παρακάτω διάμεσες πνευμονίες προσβάλλει όλες τις ηλικίες και τα δύο φύλα εξίσου;

- α. COP
- β. NSIP
- γ. AIP
- δ. DIP
- ε. α+γ

Σωστές απαντήσεις:

1. δ, 2. β, 3. α, 4. γ, 5. β, 6. γ, 7. α, 8. β, 9. β, 10. δ, 11. δ, 12. γ, 13. γ, 14. β, 15. ε