

## Πνευμονία

**1. Αυξημένη θνητότητα συνοδεύει την πνευμονία, όταν συνυπάρχουν όλα τα παρακάτω ευρήματα, εκτός από ένα:**

- α. Μικροβαιμία
- β. Υψηλός πυρετός και ταχυκαρδία
- γ. Χρόνιος αλκοολισμός
- δ. Προσβολή δύο λοβών

**2. Στην πνευμονιοκοκκική πνευμονία, στο στάδιο της φαιάς ηπάτωσης, τι από τα παρακάτω ισχύει;**

- α. Κυριαρχούν τα ουδετερόφιλα και τα ερυθρά αιμοσφαίρια μειώνονται
- β. Μακροσκοπικά ο πνεύμονας γίνεται γκριζοκίτρινος
- γ. Ακολουθείται από το στάδιο της λύσης
- δ. Όλα τα παραπάνω

**3. Ποιο από τα παρακάτω δίδυμα αντιβιοτικών είναι αποτελεσματικό σε όλα τα είδη ανθεκτικών πνευμονιόκοκκων;**

- α. Φθοριοκινιλόνες - αζιθρομυκίνη
- β. Βανκομυκίνη - λινεζολίδη
- γ. Κεφταζιδίμη - κεφτριαξόνη
- δ. Ιμιπενέμη - τριμεθοπρίμη+σουληφομεθοξαζόλη

**4. Ποιο από τα παρακάτω προκαλεί λιγότερο συχνά πνευμονικό απόστημα;**

- α. Πνευμονιόκοκκος
- β. Σταφυλόκοκκος χρυσίζων
- γ. Pseudomonas aeruginosa
- δ. Αναερόβια

**5. Ποιο από τα παρακάτω παθογόνα προκαλεί συχνότερα πνευμονία στις ακραίες ηλικίες (παιδιά - υπερήλικες);**

- α. Πνευμονιόκοκκος
- β. Σταφυλόκοκκος
- γ. Μυκόπλασμα
- δ. Αιμόφιλος

**6. Ένα από τα παρακάτω δεν ισχύει στην πνευμονιοκοκκική πνευμονία:**

- α. Υπάρχει θωρακικό άλγος πλευριτικού τύπου
- β. Υπάρχει βακτηριαιμία σε ποσοστό 85% των ασθενών
- γ. Υπάρχει συνήθως υψηλός πυρετός με ρίγος
- δ. Υπάρχει συχνά ομόπλευρη υπεζωκοτική συλλογή υγρού

**7. Σε ασθενείς <50 ετών, προηγουμένως υγιείς, με εξωνοσοκομειακή πνευμονία από πνευμονιόκοκκο, τα ακτινολογικά ευρήματα έχουν πλήρως υποχωρήσει μέσα σε 4 εβδομάδες, σε ποσοστό:**

- α. 20%
- β. 60%
- γ. 80%
- δ. 100%

**8. Ο σχηματισμός πνευμονικού αποστήματος, σε πρώιμο στάδιο πνευμονίας ενοχοποιεί:**

- α. Το σταφυλόκοκκο
- β. Την κλημψιέλλα
- γ. Τον πνευμονιόκοκκο
- δ. Τα αναερόβια μικρόβια

**9. Ποια από τις παρακάτω ομάδες κινδύνου μπορεί να εμφανίσει συχνότερα σταφυλοκοκκική πνευμονία από ιό γρίπης τύπου Α:**

- α. Οι καρδιοπαθείς
- β. Οι διαβητικοί
- γ. Οι γυναίκες σε εγκυμοσύνη
- δ. Οι νεφροπαθείς

**10. Σε σοβαρή πνευμονία από Legionella είναι συχνά τα παρακάτω, εκτός από ένα:**

- α. Σοβαρή υπονατριαιμία και διάρροια
- β. Θρομβοπενία και αιματουρία
- γ. Εγκεφαλοπάθεια και σύγχυση
- δ. Αιμορραγικό εξάνθημα και ηεμφοπενία

**11. Η πνευμονία που εμφανίζεται στο δεξιό μέσο λοβό, σέβεται την ελάχισσωνα μεσολόβιο και η σκίαση που σχηματίζεται στην α/α θώρακος έχει το κυρτό προς τα κάτω, συνήθως οφείλεται σε:**

- α. Staphylococcus aureus
- β. Streptococcus pneumoniae
- γ. Klebsiella pneumoniae
- δ. Legionella pneumophila

**12. Σύμφωνα με τη Βρετανική Θωρακική Εταιρεία (British Thoracic Society, BTS) κριτήρια βαρύτητας της εξωνοσοκομειακής πνευμονίας είναι όλα τα παρακάτω εκτός από:**

- α. Διανοπτική σύγχυση
- β. Αναπνευστική συχνότητα  $\geq 30/\text{min}$
- γ. Συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ)  $< 90\text{mmHg}$  και/ή διαστολική (ΔΑΠ)  $\leq 60\text{mmHg}$
- δ. Ολική χοληρυθρίνη  $\geq 2\text{mg/dL}$

**13. Ποια είναι η προτεινόμενη εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή σε ασθενή που νοσηλεύεται για πνευμονία κοινότητας και δεν έχει λάβει πρόσφατα άλλη αγωγή;**

- α. Αναπνευστική φλουοροκινολόνη
- β. Ιμιπενέμη
- γ. Κεφαλοσπορίνη β' γενιάς
- δ. Κεφαλοσπορίνη γ' γενιάς

**14. Ποια είναι η εμπειρική θεραπεία πνευμονίας σε εξωνοσοκομειακό ασθενή με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη ή αλκοολισμού;**

- α. Κεφαλοσπορίνη β' γενιάς
- β. Κεφαλοσπορίνη β' ή γ' γενιάς και αμινογλυκοσίδη
- γ. Κρυσταλλική πενικιλίνη και αμινογλυκοσίδη
- δ. Βανκομυκίνη ως μονοθεραπεία

**15. Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να προκαλέσει υποτροπιάζουσα πνευμονία;**

- α. Χρόνιος αλκοολισμός
- β. Βρογχεκτασίες
- γ. Καρδιακή ανεπάρκεια
- δ. Όλα τα παραπάνω