PubMed www.pubmed.gov

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ MEDLINE

Αγγειοοίδημα οφειλόμενο σε α-ΜΕΑ και σε ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ

Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor antagonists

Kyrmizakis DE, Papadakis CE, Liolios AD, Karatzanis AD, Malandrakis S, Skoulakis CE, Bizakis JG, Velegrakis GA. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2004 Dec; 130(12):1416-9.
Department of Ear, Nose, and Throat, University Hospital, Heraklion, Crete, Greece. dkyrmiz@yahoo.com

Επιμέλεια:
Κυρμιζάκης Διονύσιος
Τμήμα ΩΡΛ, ΠΓΝΗ Ηράκλειο Κρήτης

Η χρήση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ) έχει ενοχοποιηθεί για πολλές περιπτώσεις αγγειοοιδήματος, ενώ, εάν θεωρηθεί η παθοφυσιολογία αυτής της ανεπιθύμητης ενέργειας σωστή, δεν αναμένεται να εμφανίζεται αγγειοοίδημα με την χρήση των ανταγωνιστών των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (ΑΥΑ-ΙΙ). Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν στην βιβλιογραφία μεμονωμένα περιστατικά αγγειοοιδήματος για τα οποία υπεύθυνα θεωρήθηκαν οι ΑΥΑ-ΙΙ. Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη από την 1 Ιανουαρίου 1998 έως την 30 Ιουνίου του 2003, καθώς και μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Κατά αυτό το χρονικό διάστημα, αντιμετωπίσαμε 31 ασθενείς με αγγειοοίδημα οφειλόμενο σε α-ΜΕΑ (27 περιστατικά) και σε ΑΥΑ-ΙΙ (4 περιστατικά). Όλοι οι ασθενείς είχαν σοβαρό βλεννογόνιο οίδημα και σε μερικούς υπήρχαν σοβαρού βαθμού δύσπνοια ή και δυσφαγία. Οι περιοχές οι οποίες πιο συχνά βρέθηκαν προσβεβλημένες ήταν: τα πρόσθια δύο τριτημόρια της γλώσσας (13 περιπτώσεις), σταφυλή και μαλθακή υπερώα (5), λάρυγγας (3), έδαφος στόματος (3) και χείλη (3). Η επιπλοκή του αγγειοοιδήματος, ύστερα από την χρήση και των δυο αυτών οικογενειών φαρμάκων, ίσως είναι συχνότερη από ό,τι νομίζεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η επιπλοκή μπορεί να εμφανιστεί μετά από μακροχρόνια χορήγηση αυτών των φαρμάκων. Σαν συμπέρασμα θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν είναι ασφαλής η χρήση των ΑΥΑ-ΙΙ σε άτομα με ιστορικό αγγειοοιδήματος, ιδίως εάν αυτό ήταν αποτέλεσμα λήψης α-ΜΕΑ.

Κυτταρολογία με ψήκτριση σε δερματικές βλάβες της κεφαλής και του τραχήλου

Brushing cytology in cutaneous lesions of the head and neck

Tamiolakis D, Proimos E, Perogamvrakis GE, Skoulakis CE, Georgiou GC, Papadakis CE.
Department of Cytopathology, Chania General Hospital, Chania, Crete, Greece.
J Laryngol Otol 2007 Jul; 121(7):676-9. Epub 2007 Apr 3.

Επιμέλεια:
Παπαδάκης Χαρίτων,
Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής ΓΝ Χανίων, Χανιά Κρήτης

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ: Η κυτταρολογία με ψήκτριση είναι μια καλά καθιερωμένη διαγνωστική διαδικασία, που χρησιμοποιείται από τους γυναικολόγους, παθολόγους και χειρουργούς για τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από βλάβες. Σκοπός μας ήταν να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία της μεθόδου σε ελκωτικές και καταστάσεις που μοιάζουν με όγκο και αναδύονται στο δέρμα της κεφαλής και του τραχήλου.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Για μια χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 28 μηνών έγινε κυτταρολογική εξέταση με τη χρήση ψήκτρας κυττάρων (cytobrush) σε 86 ασθενείς που επισκέφτηκαν την Ωτορινολαρυγγολογική κλινική του νοσοκομείου Χανίων Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η κυτταρολογική ανάλυση εντόπισε σε 63 από τους 64 ιστολογικά αποδεδειγμένους κακοήθεις όγκους (60 βασικοκυτταρικά και επιθηλιακού τύπου καρκινώματα και τρία μεταστατικά αδενοκαρκινώματα) και 21 από 22 καλοήθεις βλάβες. Υπήρξε ένα ψευδώς θετικό και ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα.

Νέες συσκευές ASSR και VEMP της Interacoustics

Το 1ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας πραγματοποιήθηκε στην Κυλλήνη στις 5-7 Οκτωβρίου 2007 με μεγάλη επιτυχία. Το Σεμινάριο διοργάνωσε η Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Πάτρας.

Κατά τη διάρκειά του, παρουσιάστηκαν από την εταιρεία GP Medicals Γαζή-Παππάς ΟΕ, οι νέες πρωτοποριακές συσκευές ASSR και VEMP της Interacoustics Δανίας .

Η συσκευή ASSR είναι η μοναδική που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή παγκοσμίως με 2 πραγματικά κανάλια καθώς μειώνει το χρόνο δοκιμασίας κατά 50% και οι προηγμένοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται λαμβάνουν υπ'όψιν τη φάση και ταυτόχρονα το εύρος της απόκρισης. Επίσης η μελέτη οχι μόνο της πρώτης αλλά και των υψηλότερων αρμονικών βελτιώνουν σημαντικά την ανίχνευση ακοής.

Η Interacoustics αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία GP Medicals Χ. Γαζή-Ε. Παππάς ΟΕ.