



Η επανορθωτική χειρουργική της ουρήθρας - Σύγχρονες θέσεις

▶ 8

Κιρσοκήλη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση

Κιρσοκήλη είναι η κιρσοειδής διάταση των κλάδων του φλεβικού πλέγματος (rampriniiform plexus) των σπερματικών φλεβών. Είναι ένα συχνό εύρημα στους υπογόνιμους άνδρες.

Η συχνότητά της στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται σε 15-20%,

ενώ στους άνδρες που διερευνούνται για υπογονιμότητα κυμαίνεται σε 30-40%. Η κιρσοκήλη συχνότερα παρατηρείται στην αριστερή πλευρά, ενώ η δεξιά εμφάνιση επιβάλλει τη διερεύνηση του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.

▶ 2



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

- Μέτρηση PSA στους ηλικιωμένους. Πότε πρέπει να σταματά;
- Αλφουζοσίνη και συμπτώματα χρόνιας προστατίτιδας - συνδρόμου χρόνιας πυελικού άλγους (CP/CPPS)
- Διακοπτόμενος ανδρογονικός αποκλεισμός για τον τοπικά προχωρημένο και το μεταστατικό καρκίνο προστάτη: Αποτελέσματα τυχαίοποιημένης φάσης III μελέτης του South European Urooncological Group

▶ 17



Ουρολογικά Συνέδρια



▶ 18